
Verdens helse

INTERNASJONAL MEDISIN

BERNT LINDTJØRN

Email: bernt.lindtjorn@cih.uib.no

Senter for internasjonal helse

Universitetet i Bergen

HIV-barn trenger antiretroviral behandling

I 2002 startet Verdens helseorganisasjon en storstilt kampanje for at flere AIDS-pasienter i verdens fattige land skal få antiretroviral behandling. To år senere får likevel færre enn 5 % av dem som trenger det, slik behandling. For barn er situasjonen enda verre. Over to millioner barn er HIV-infisert, de fleste i Afrika og India, og halvparten av dem vil dø før de fyller to år.

Det haster med å gi barn med AIDS god omsorg og antiretroviral behandling. Det er et stort behov for å utvikle og forenkle AIDS-behandlingen. Noen voksne har problemer med å svelge de store tablettene, men produksjonen av legemidlene er i enda mindre grad tilpasset barnas behov. Antiretrovirale legemidler i flytende form lukter, og «voksne tabletter» er for store til at barn kan svelge dem. De billigste behandlingsalternativene for barn koster i dag om lag 1 300 amerikanske dollar, mens tilsvarende priser for behandling av voksne er mindre enn 200 amerikanske dollar.

I India øker diskriminering av AIDS-syke barn (1). Mange HIV-positive barn blir utvist fra skoler og barnehager og til og med utskrevet fra sykehus. Barns rettsvern må styrkes. På samme måte som diskriminering av HIV-positive voksne avtok da de fikk antiretroviral behandling, vil bedre tilgang på slik behandling til barn bedre barnas situasjon.

LITTERATUR

1. Human Rights Watch. Future forsaken. Abuses against children affected by HIV/AIDS in India. 2004.

<http://hrw.org/reports/2004/india0704/FutureForsaken.pdf> (1.11.2004).

Publisert: 2. desember 2004. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2025. Lastet ned fra tidsskriftet.no 23. desember 2025.