

---

## LES MER ...

---

I DETTE NUMMER

---

---

### Fra redaktøren

Doktorgraden må fortsatt gi uavkortet uttelling i spesialistutdanningen av leger. Vi må også akseptere at tema og metode for forskningen stammer fra et annet medisinsk fagområde.

Den derre forkinga

---

### Hjerneblødning i Vestfold

Rundt 40 % av pasientene som ble innlagt for hjerneblødning ved Sykehuset i Vestfold i perioden 2010 – 14, døde innen 30 dager. Av dem som var i live etter tre måneder, hadde om lag halvparten god funksjon, og rundt en tredel var tilbake i egen bolig. Basert på disse innleggelsene var årlig incidens for førstegangs spontan intracerebral blødning i fylket 20,5 per 100 000 innbyggere.

Behandling av hjerneslag

Spontane intracerebrale blødninger i Vestfold

---

### Minuttene teller ved hjerneslag

Rundt to tredeler av pasientene som ble innlagt i Akershus universitetssykehus med akutt hjerneslag i perioden 2009 – 10, hadde kontaktet AMK-sentralen, og over 90 % av disse ble transport i ambulanse direkte til sykehuset. Mer enn 60 % av dem som hadde kontaktet fastlege eller legevakt, ble bedt om å møte opp på fastlegekontor eller legevakt. Selv om disse pasientene hadde mildere utfall, medførte dette unødig tidstap.

Behandling av hjerneslag

## Prostatakreft med fjernmetastaser

Behandlingen ved prostatakreft med fjernmetastaser er under endring. Ved medikamentell eller kirurgisk kastrasjon fjernes androgenstimulering av kreftcellene i den kastrasjonsfølsomme fasen. Tidlig bruk av cytostatika bør vurderes. I kastrasjonsresistent fase står valget mellom cytostatika og nyere hormonbehandling.

En kvinne i 30-årene med brystkreft og bilateral struma

---

## Ung kvinne med brystkreft og knutestruma

En kvinne i slutten av 30-årene med type 1-diabetes og knutestruma ble innlagt med mistanke om lokalavansert karsinom i høyre bryst. Slike synkrone funn av tumorpregede forandringer i flere organer hos yngre personer er uvanlig. I slike tilfeller er tverrfaglig tankegang og samarbeid avgjørende for å komme frem til riktig diagnose og behandling.

En kvinne i 30-årene med brystkreft og bilateral struma

---

Publisert: 6. juni 2017. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 27. mars 2026.