
Les mer om

[LES MER OM](#)

Hvordan behandles h ndleddsbrudd?

Ved h ndleddsbrudd varierer valg av behandling og bruk av plater s v rt mye mellom ulike deler av landet. Dette viser en analyse av data fra Norsk pasientregister for perioden 2009–14. Bruken av perkutan pinning og ekstern fiksasjon avtok til fordel for  pen teknikk med plateosteosyntese. Forekomsten av h ndleddsbrudd var stabil og h yest blant kvinner.

Klamydiatesting – for mye eller for lite?

Kvinner over 30  r testes for ofte for genital klamydiainfeksjon, noe som inneb rer un dig ressursbruk. Dette er konklusjonen av en gjennomgang av alle pr ver analysert for *Chlamydia trachomatis* ved Sykehuset i Vestfold gjennom en fem rsperiode. Menn, spesielt unge menn, b r sjekkes oftere.

Kreftcellers DNA

Kreftsvulster er kjennetegnet av ustabilit DNA med mange mutasjoner, feilregulering av gener og tap av celledelingskontroll. Analyser for DNA-ploiditet, dvs. relativt DNA-innhold i en cellepopulasjon, kan brukes for   vurdere prognosen ved kreft. Dermed kan man bedre avgj re hvilke pasienter som trenger tilleggsbehandling, og kanskje unng  overbehandling, s rlig ved lite aggressive former for kreft.

Publisert: 16. oktober 2017. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.17.19.03

  Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 25. mars 2026.