
Spontan retroperitoneal blødning

ARTIKKEL

WESSEL N

MJÅSET B

GERNER T

Sammendrag

Spontan retroperitoneal blødning skyldes oftest rumpert lumbalt aortaaneurisme. Patologi i andre retroperitonealeorganer, hyppigst nyre og binyre, kan også gi retroperitoneal blødning. Nyreblødningen skyldes oftest tumor, karlesjoner, eller inflammasjoner. Binyreblødningen sees hos pasienter utsatt for stress eller ved feokromocytom. Spontan ruptur av vene, oftest v. iliaca communis, eller blødning hos pasienter under antikoagulasjonsbehandling er sjeldnere årsaker. Symptomene er akutt abdominal smerte, hypotensjon og abdominal oppfylning. Diagnosen stilles ved ultrasonografi/computertomografi av abdomen, eventuelt angiografi eller scintigrafi. Behandlingen retter seg etter pasientens aktuelle tilstand og sykdommens etiologi. Vi presenterer tre kasuistikker for å belyse symptomatologi, diagnostikk og behandling.

Publisert: 10. februar 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 28. mars 2026.