
Prostatakreft i Oslo - reell nedgang?

ARTIKKEL

HARVEI S

TRETLI S

HAGEN S

Sammendrag

Mens insidens av prostatakreft i landets regioner har steget hele tiden siden kreftregistreringen begynte i 1950-årene, har den fra 1970-årene vist en nedadgående tendens for hovedstaden. Ved nærmere analyser avspeiles disse endringene bare i aldersgruppene over 70 år, og de eldste aldersgrupper viser sterkest nedgang. Den viktigste årsak til nedgangen ligger i at antall tilfeller diagnostisert ved obduksjon er gått vesentlig ned, fra 12,7% i 1957-61 til 3,8% i 1987-91. Men selv etter at disse er ekskludert, er det en svak nedgang i insidens. Andre kreftformer viser ikke de sammenhengende tendenser.

Det avtegner seg et mønster som tyder på at diagnostikken av prostatakreft i Oslo er blitt mindre intensiv enn ellers i landet for øvrig og at dette kan ha med tildeling av ressurser og prioritering å gjøre. Andre forhold som kunne gi enslik utvikling, som f. eks. en stabilisering av risikoen for prostatakreft, er diskutert.

Publisert: 28. februar 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 30. mars 2026.