
Prognosen ved primære svulster i sentralnervesystemet

ARTIKKEL

LOTE K

GUNDERSEN S

HANNISDAL E

HAGER B

STENWIG AE

TVERÅ K

BERG-JOHNSEN J

SKULLERUD K

BAKKE SJ

HIRSCHBERG H

Det Norske Radiumhospitals pasientmateriale 1980-94

Sammendrag

I tidsrommet 1980-94 ble 1218 pasienter med primære svulster i sentralnervesystemet behandlet ved Det Norske Radiumhospital. Prognosen for pasienter med primære svulster i sentralnervesystemet varierer betydelig med

tumorens histologi og lokalisasjon, samt med pasientens alder og funksjonsstatus. Vi rapporterer overlevelsen for pasienter med glioblastom (n = 492, median overlevelse 12 måneder), anaplastisk astrocytom (n = 83, median overlevelse 25 måneder), astrocytom (n = 260, median overlevelse 95 måneder), oligodendrogliom (n = 85, median overlevelse 74 måneder), blandingsgliom (n = 68, median overlevelse 65 måneder), medulloblastom/primitiv neuroektodermal tumor (n = 53, median overlevelse 109 måneder), samt for pasienter med tumorlokalisasjon i hjernestamme (n = 37, median overlevelse 11 måneder), corpus pineale-regionen (n = 38, femårsoverlevelse 74%) og medulla spinalis (n = 22, femårsoverlevelse 50%). Alder og neurologisk funksjonsstatus er også viktige prognostiske faktorer for pasienter med svulster i sentralnervesystemet.

Publisert: 30. april 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 29. mars 2026.