
Pro-atrial natriuretisk faktor i plasma er prediktiv for klinisk status hos hjertesviktpasienter

ARTIKKEL

DICKSTEIN K

LARSEN AI

BONARJEE V

THORESEN M

AARSLAND T

HALL C

Sammendrag

Hjertesvikt kjennetegnes av forhøyet fylningstrykk, strekk av atriene og påfølgende sekresjon av atrial natriuretiskfaktor (ANF). Under sekresjonsprosessen spaltes ANF-molekylet i det fysiologisk aktive C-terminale fragmentet og et N-terminalt fragment. Det N-terminale fragmentet, som vanligvis kalles pro-ANF, er mest stabil og lettest å analysere. Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge forholdet mellom pro-ANF og klinisk status.

Pro-ANF-verdier ble målt hos 202 polikliniske pasienter med hjertesvikt. Pro-ANF viste en sterkere korrelasjon til New York Heart Association (NYHA)-klasse enn radionukleær ejeksjonsfraksjon, ekkokardiografisk venstre ventrikel-endediastolisk diameter eller systolisk lungearterietrykk estimert ved dopplerundersøkelse. Pro-ANF var bedre korrelert til ikke-invasive målinger enn NYHA-klassifiseringen. Oddsratioestimer viste en betydelig økt risiko for venstre ventrikel-dysfunksjon og dilatasjon, pulmonal hypertensjon

samt NYHA-klasse III-IV med økende pro-ANF-verdier. Disse resultatene viser at konsentrasjonen av pro-ANF er relatert til graden av klinisk hjertesvikt. Analysen vil kunne få betydning som et supplement til vanlig klinisk vurdering av hjertesviktpasienter. Det er imidlertid fortsatt behov for ytterligere forskning før prøvens plass i den medisinske utredning er endelig definert.

Publisert: 20. mai 1996. Tidsskr Nor Lægeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 16. februar 2026.