
Radiologiske undersøkelser ved hodeskader

ARTIKKEL

LARSEN J L

KRÅKENES J

Senfølger også etter lettere hodeskader er en radiologisk utfordring

Sammendrag

35-40% av pasienter med mer eller mindre alvorlige hodeskader har senplager. Selv om prognosen ved slike tilstander som regel er god, er det en betydelig del av pasientgruppen som vil få kroniske senfølger. Særlig for denne gruppe vil en grundig klinisk og radiologisk undersøkelse i tilslutning til skaden være av stor betydning, f.eks. i forbindelse med forsikringssaker og erstatning, ved yrkesskader og ved senere yrkesvalg.

Magnettomografi (MT) har vist seg å være den beste undersøkelse når det gjelder alvorlige hodeskader og vil påvise atskillig flere lesjoner enn hva som er mulig ved computertomografi (CT). Vi mener imidlertid at indikasjonssområdet for magnettomografiske undersøkelser ved kranietraumer bør utvides fordi man da kan påvise lesjoner; noe som kan være utslagsgivende når det f.eks. gjelder forsikringssaker. Også pasienter hvor CT-undersøkelse ikke har vist tegn til hjerneskade, kan få påvist dette ved MT og vil trenge oppfølging og hjelp utover den rent akuttmedisinske.

Publisert: 30. august 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 17. februar 2026.