
Mykofenolatmofetil - nytt immunsuppressiv

ARTIKKEL

BERGAN S

ALBRECHTSEN D

FAUCHALD P

Sammendrag

Mykofenolatmofetil (MMF) omdannes raskt til mykofenolsyre (MPA), som er den aktive substans. Den immunsuppressiveeffekt utøves ved hemming av enzymet inosinmonofosfat-dehydrogenase; dette medfører redusert tilgjengelighet avguaninnukleotider og dermed nedsatt RNA- og DNA-syntese og celleproliferasjon, med en relativ selektivitet overforlymfocytter. De viktigste bivirkninger er leukopeni og ulike gastrointestinale bivirkninger. I tillegg kommer dengenerelle risiko for infeksjon samt maligne sykdommer som følge av langvarig immunsuppresjon. I tre størremultisenterstudier er det vist betydelig reduksjon av rekjesjonsepisoder i de første måneder etter nyretransplantasjon ved bruk av mykofenolatmofetil. Dette medførte mindre bruk av steroider og lymfocytantistoff. Bivirkningsfrekvensen var imidlertid også høyere. Det var ikke signifikant bedret transplantatoverlevelse etter ett år.

Transplantasjonsmiljøet her i landet har tradisjon for behandlingsprinsipper basert på bred konsensus. Det er foreløpig ikke funnet grunn til å innføre mykofenolatmofetil i den rutinemessige immunsuppresjon ved transplantasjon, men preparatet er tatt i bruk på spesielle indikasjoner.

Publisert: 30. august 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2025. Lastet ned fra tidsskriftet.no 27. desember 2025.