
Anemi og lavt serum-kobalaminnivå

ARTIKKEL

BERENTSEN S

NEDREBØ BG

Sammendrag

Vi har undersøkt sju pasienter med lavt serum-kobalaminnivå der relasjonen til kliniske symptomer og hemoglobinverdivar vanskelig å tolke. Fem pasienter hadde anemi. Fire anemiske pasienter hadde myelodysplastisk syndrom, men tre avdisse hadde samtidig reell vitamin B12-mangel. En anemisk pasient hadde høygradig malignt non-Hodgkins lymfom med Coombs-negativ autoimmun hemolytisk anemi. Hos de to pasientene som ikke hadde anemi, var lavt serum-kobalaminnivå etfalskt positivt funn hos friske personer. Selv om kobalaminbestemmelse bør rekvireres på liberale indikasjoner, erdisse to pasientene eksempler på at indikasjonene kan bli for liberale. I tvilstilfeller kan nivåbestemmelse av homocystein i plasma og metylmalonsyre i serum bidra til å avklare diagnostiske problemer relatert til vitamin B12-mangel.

Publisert: 20. september 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 9. februar 2026.