
Kvikksølv og kreatinin i urin hos magnetfelteksponerte arbeidstakere

ARTIKKEL

SCHMIDT F

MANNSÅKER T

Sammendrag

Foreliggende resultater er basert på en undersøkelse av 26 elektrolyseoperatører. De ble eksponert for en kombinasjon av statiske magnetfelter (3-10 mT) og lavfrekvente tidsvariable magnetfelter med varierende styrke og frekvens åttetimer daglig i fire uker. Etter de fire arbeidsukene hadde operatørene en uke fri. Urinprøver innhentet etter firearbeidsuker ble sammenliknet med urinprøver innhentet etter friuke.

Resultatene viser at elektrolyseoperatørene hadde en signifikant høyere utskilling av kvikksølv i urin ettereksponering for magnetfelter ($p = 0,01$). Det var også en signifikant høyere kvikksølv-kreatinin-ratio ($p < 0,01$).

Resultatene underbygger Schmidts funn i en sammenliknende undersøkelse av 1992 på kvikksølv- og kreatininutskilling i urin hos elektrolyseoperatører og kontorpersonell.

Publisert: 20. januar 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 3. januar 2026.