
Betablokkerbehandling av hjertesviktpasienter

ARTIKKEL

GUNDERSEN T

DICKSTEIN K

HOLE T

KJEKSHUS J

MYHRE ESP

RØNNEVIK P

SMITH P

WESTHEIM A

Sammendrag

Nyere undersøkelser har vist at behandling med betablokkere bedrer prognosen hos pasienter med nedsatt venstreventrikkelfunksjon. Behandling med timolol og propranolol reduserer mortaliteten hos pasienter med kardiomegali og kompensert svikt etter gjennomgått hjerteinfarkt.

Metoprololbehandling hos pasienter med idiopatisk dilatertkardiomyopati øker venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, bedrer symptomer og forebygger klinisk forverring. Behandling med karvedilol bedrer prognosen hos pasienter med dilatert kardiomyopati og hos pasienter med postinfarktsvikt.

Denne artikkelen gir en oversikt over aktuelle studier, for å stimulere til rasjonell bruk av betablokkere hosselekterte pasienter med hjertesvikt.

Publisert: 10. februar 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 20. februar 2026.