
Kollisjonsputer påvirker skademønsteret ved alvorlige thoraxtraumer

ARTIKKEL

PILLGRAM-LARSEN J

GEIRAN O

Sammendrag

Sentral torakal karskade ble funnet hos to bilførere og hjerteskode hos én etter kraftige frontkollisjoner hvorkollisjonspute ble utløst. En mann på 32 år anvendte ikke sikkert bilbelte. Han pådrog seg intimaskade av truncusbrachiocephalicus. Det forelå uttalte bløtdelshematomer fortil i thorax. En kvinne på 39 år var sikret med bilbelte. Hun var bevisstløs med ekstensjonsspasmer, hadde en ruptur av aorta descendens, dessuten bekkenfraktur. Hos begge blekaroperasjon utført. Kvinnen døde etter to måneder uten å ha kommet til bevissthet. Den siste pasienten, en mann på 47 år, var ikke sikret med belte. Han ble livløs etter noen få minutter. Ved median nødtorakotomi ved innleggelse fant mantotal ruptur av høyre atrium.

Kollisjonsputer hindrer skade av støt mot kjøretøyets indre, men forhindrer ikke nødvendigvis deselerasjonstraumerved høye hastigheter. En del pasienter kan ved bruk av kollisjonspute nå sykehuset med kritiske deselerasjonsskader og få ytre skadetegn.

Publisert: 30. juni 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 18. februar 2026.