
Diabetesomsorg i norsk allmennpraksis

ARTIKKEL

CLAUDI T

COOPER J

SKOGØY K

HAUSKEN MF

MELBYE H

Sammendrag

Det foreligger få data om kvaliteten på diabetesomsorgen i Norge. Dette gjelder både i første- og annenlinjetjenesten. Vi har gått gjennom journalene til 1876 diabetikere som var registrert hos allmennpraktiserende leger i Salten og deler av Rogaland for å undersøke hvorvidt sentrale anbefalinger i NSAMs handlingsprogram for diabetes blir fulgt. 89% av pasientene var klassifisert som type 2-diabetikere. Hb A_{1c} og blodtrykk var målt hos henholdsvis 84 og 86% av pasientene, mens føttene var undersøkt hos 45%. NSAMs behandlingsmål for Hb A_{1c} var oppnådd hos 46% av pasientene som var yngre enn 70 år og hos 82% av dem som var 70 år og eldre. Insulinbrukerne hadde den høyest gjennomsnittlige Hb A_{1c}-verdi. Det svikter noe på gjennomføringen av enkle kliniske rutiner som undersøkelse av føtter og henvisning til/kontroll hos øyelege. Undersøkelsen viser at det fortsatt er et forbedringspotensial i innendiabetesomsorgen i Norge.

Publisert: 20. oktober 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 8. februar 2026.