

---

# Kolorektalcancer

---

ARTIKKEL

SYNNESTVEDT M

MEEN Ø

HOFSTAD B

---

## Sammendrag

Det er hevdet at cancersymptomene fra de ulike områder av colon er forskjellige. Hensikten med studien var å finne uthvor godt de "klassiske" symptomene skilte mellom adenokarsinomer i henholdsvis høyre og venstre colon og rectum. Dette var en retrospektiv studie av 102 pasienter med kolorektalcancer ved Ullevål sykehus 1992. Rødt blod i avføringen ( $p = 0,001$ ) og endret avføringsmønster ( $p = 0,001$ ) var venstresidig cancer-spesifikke og rectumspesifikke symptomer. Videre var tenesmer, slim i avføring og defekasjonssmerter rectumspesifikt. Melena ( $n = 8$ ), diaré ( $p = 0,23$ ), slapphet ( $p = 0,13$ ), vekttap ( $p = 0,09$ ), subileus/ileus ble ikke funnet lokalisasjonsspesifikt, noe som ofte hevdes i lærebøkene. Smerte samsvarte alltid med lokalisasjon ved høyre- og venstresidig cancer, men ved rectumcancer mer variabelt lokalisert og forekom her også relativt ofte (37%) i Dukes' stadium A og B. Kun få pasienter hadde anoreksi, men dette var likevel signifikant for høyresidig cancer ( $p = 0,04$ ). Våre resultater støtter generelt lærebøkene, med noen unntak, og henvisningssymptomer kan være en hjelp til videre utredning av kolorektalcancer, når man har problemer med å oppnå total koloskopi.

---

Publisert: 30. oktober 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 15. februar 2026.