

Diagnose og behandling av svær hyperlipidemi

ARTIKKEL

TONSTAD S

LEREN TP

OSE L

Sammendrag

Svær hyperlipidemi (totalkolesterolnivå ≥ 13 mmol/l) er en sjelden tilstand der det er viktig å stille en korrektdiagnose. Vi undersøkte 57 pasienter med isolert hyperkolesterolemi. Fire var homozygoter for familiærhyperkolesterolemi, 52 var heterozygoter og én hadde sitosterolemi. Det ble funnet 15 forskjellige LDL-reseptormutasjoner blant gruppen med familiær hyperkolesterolemi. Kombinert hyperlipidemi der totalkolesterolnivåer ≥ 13 mmol/l, skyldes vanligvis en indremedisinsk sykdom som diabetes mellitus, nyre- eller leversykdom. Etter at grunn sykdommen er behandlet, bør behovet for lipidmodifiserende medisin vurderes på nytt. Når man unntar atorvastatin og fiskeoljekapsler, er preparater som reduserer triglyseridnivået betydelig, ikke registrert i Norge i dag. Vipresenterer aktuelle medikamenter som har vist virkning i kontrollerte studier.

Publisert: 30. november 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2025. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. desember 2025.