
Perkutan endoskopisk gastrostomi til enteral ernæring

ARTIKKEL

HAUGE T

AUBERT E

SANDVEI P

Sammendrag

En økende bruk av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) til enteral ernæring kombinert med mange forskjellige katetretilgjengelig på markedet, gjør det ønskelig å diskutere indikasjoner og bruk. 50 pasienter som har fått endoskopiskgastrostomi til enteral ernæring ved Østfold sentralsykehus i tidsrommet 1993-96, er evaluert.

Metoden fungerer godt og medfører få komplikasjoner, den bør overveies tidlig ved behov for enteral ernæring. Defleste voksne pasienter klarer seg med et gastrostomikateter, bruken av port diskuteres. Det er svært viktig atbrukerne får utførlig informasjon om bruk og stell av gastrostomi til enteral ernæring.

Vi har gode erfaringer med en egen PEG-poliklinikk drevet av sykepleier. Perkutan endoskopisk gastrostomi egner seggodt til enteral ernæring hjemme, men forholdene må tilrettelegges.

Publisert: 20. januar 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 20. februar 2026.