
Trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt

ARTIKKEL

SCHEI M

HESSEN JO

KILDAHL-ANDERSEN O

Sammendrag

Journalene til alle pasienter med utskrivningsdiagnosen akutt hjerteinfarkt ved Harstad sykehus i løpet av 1995, totalt 170, ble gjennomgått. 24% av pasientene fikk trombolytisk behandling. 15% av pasientene fikk ikke trombolytisk behandling på tross av behandlingsindikasjon og fravær av kontraindikasjoner. Trombolytisk behandling ble igangsatt igjennomsnitt to timer og 18 minutter etter innleggelse og sju timer etter symptomdebut. 54% av pasientene hadde ankommet sykehus innen seks timer etter symptomdebut og 73% innen 12 timer. Den sykehusinterne forsinkelsen førte til at trombolytisk behandling ble gitt, ansees for lang. Denne faktoren er tidligere i liten grad undersøkt ved norske sykehus.

På tross av relativt standardisert behandlingsopplegg er det i dag trolig forskjeller i bruk av trombolytisk behandling mellom norske sykehus. Potensialet for å bedre den trombolytiske behandlingen er sannsynligvis betydelig. Resultatene har ført til omfattende omlegging av rutine ved Harstad sykehus.

Publisert: 20. februar 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2025. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. desember 2025.