
Forekomst av angst og depresjon hos kreftpasienter

ARTIKKEL

AASS N

FOSSÅ SD

DAHL AA

MOE TJ

Sammendrag

Forekomsten av angst og depresjon hos 716 uselekterte innlagte og polikliniske pasienter ved Det Norske Radiumhospitalet ble evaluert ved hjelp av The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), EORTC QLQ-C33 og et spørreskjema lagetspesielt for undersøkelsen. Det sistnevnte kartla sosiodemografiske forhold og sykdomsrelaterte faktorer. I henhold til kriteriene for HADS ble det påvist at 13% av pasientene hadde angst og 9% led av depresjon. Logistisk regresjonsanalyse viste at ingen sykdomsrelaterte variabler var statistisk signifikante, mens tidligere psykiske problemer og reduksjon av sosiale aktiviteter predikerte både angst og depresjon. Redusert fysisk funksjonstilstand, redusert arbeidsevne samt det å være kvinne var også korrelert til angst. Utmattethet var korrelert til depresjon. Pasienter som rapporterer en eller flere av ovenstående prediktorer synes å være spesielt utsatt for angst og depresjon under forløpet av enkreftsykdom.

Publisert: 20. februar 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2025. Lastet ned fra tidsskriftet.no 23. desember 2025.