
Diagnostisk molekylærbiologi ved brystkreft

ARTIKKEL

ANDERSEN TI

BØRRESEN-DALEA-L

Sammendrag

Studiene av molekylærgenetiske forandringer ved brystkreft har langsomt økt vår forståelse av den biologiske prosess som forandrer en normal brystepitelcelle til en brystkreftcelle med invasive og metastaserende egenskaper.

Kimbane (germ-line)-mutasjoner i genene BRCA1 og BRCA2 ser ut til å kunne forklare hovedandelen av tilfellene avhereditær brystkreft. Helsevesenet tilbyr genetisk utredning og veiledning til brystkreftfamilier. Hensikten er å girisikopersonene intervensjon slik at kreftutvikling kan påvises på et tidligst mulig stadium.

Undersøkelser av ulike molekylærgenetiske forandringer i tumor kan i fremtiden komme til å få betydning for diagnostikk, prognosevurdering og valg av terapi for den enkelte brystkreftpasient. En bedret forståelse av demolekylærgenetiske forandringer som fører til utvikling av brystkreft, kan dessuten komme til å danne grunnlaget for nye behandlingsstrategier som er rettet mot spesifikke genetiske forandringer i tumor.

Publisert: 10. juni 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2025. Lastet ned fra tidsskriftet.no 28. desember 2025.