
Kvinnelige kjønnshormoner øker risikoen for brystkreft

ARTIKKEL

VATTEN L

Sammendrag

Antall kvinner som får brystkreft stiger, noe som skyldes aldersutviklingen i befolkningen, men også en reellrisikooøkning. Økningen i risiko kan delvis forklares av endringer i fødsels- og familiemønster, noe kan forklares av høyere alder ved første fødsel og av færre fødsler per kvinne. Kvinnelige hormoners påvirkning av brystkjertelen er avsentral betydning, men den biologiske mekanismen for dette er fortsatt ikke klarlagt. Bruk av hormoner i tablettform (p-piller og hormonell substitusjonsbehandling) gir en viss økning i risiko, men når man slutter å bruke medikamentene, går risikoen tilbake til gjennomsnittlig nivå. Fremtidig epidemiologisk forskning kommer til å orientere seg mot betydningen av faser i livet som kjennetegnes av sterke hormonelle omveltninger. Vekst og utvikling i fosterlivet og ungdommens seksuelle modning og kroppslige vekstspurt er typiske eksempler. Begge faser har fått begrenset oppmerksomhet, men kan være av stor betydning for brystkreftsykdommens naturlige forløp.

Publisert: 20. august 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 9. februar 2026.