
Cytomegalovirus som årsak til toksisk colondilatasjon

ARTIKKEL

LUNDIN KEA

SELBEKK BH

MYRVANG B

LØBERG EM

Sammendrag

Toksisk dilatasjon er en fryktet komplikasjon ved inflammatoriske tilstander i colon, og dette krever ofte umiddelbarkirurgisk behandling. Tilstanden sees ikke sjelden som en komplikasjon til ulcerøs kolitt. Her beskrives en pasient medkjent ulcerøs kolitt. Han ble utredet for feber av ukjent årsak, diaré og allmennsymptomer. Ved mottak hadde hansparsomme kolittsymptomer, og han fikk ingen immunsuppressiv behandling.

Etter hvert mistenkte man at feberen skyldtes infeksjon med cytomegalovirus. Tilstanden forverret seg betydelig etstykke ut i forløpet. Koloskopi påviste utbredte ulcerasjoner, som ved virussykdom. Antiviral behandling motcytomegalovirus ble umiddelbart igangsatt, men en utvikling av toksisk dilatasjon med truende perforasjon gjorde raskkolektomi nødvendig. Histologisk undersøkelse av preparatet viste utbredte lesjoner forenlig med infeksjon medcytomegalovirus. Dette kliniske bildet er uvanlig hos ikke-immunsupprimerte pasienter.

Publisert: 10. september 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 6. februar 2026.