
Prostata spesifikt antigen ved oppfølging av konservativt behandlet prostatakreft

ARTIKKEL

OTNES B

HERNES E

FOSSÅ SD

Sammendrag

Bestemmelse av prostata spesifikt antigen i serum (PSA) har i de senere år gjort det lettere å diagnostisere prostatakreft. Blodprøven brukes imidlertid også i utstrakt grad til å følge opp pasienter med denne sykdommen. Vidiskuterer nytten av dette på grunnlag av et eget materiale på 308 pasienter, gjennomgått retrospektivt. Det er betydelig overlapping av PSA-verdier ved ulike sykdomsforløp, og vi finner lite som taler for regelmessig bruk av PSA-bestemmelse i oppfølging, unntatt i forbindelse med radikalbehandling. Hos ubehandlede eller konservativt behandlede kan behandlingsavgjørelser stort sett gjøres like godt eller bedre på grunnlag av kliniske forhold. Fordenne gruppen kan vektlegging av PSA-målinger overfor pasienten gi bekymring lenge før det blir klinisk manifestasjoner.

Publisert: 20. september 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 28. mars 2026.