
Infeksjoner forårsaket av multiresistente enterokokker i Norge

ARTIKKEL

HARTHUG S

LANGELAND N

DIGRANES A

SIMONSEN GS

OLSVIK Ø

SUNDSFJORD A

NATÅS OB

HAARR E

GAUSTAD P

HØIBY EA

SVARVA PL

Sammendrag

Gjennom de siste ti år har antibiotikaresistente bakterier utviklet seg til å bli et stort medisinsk problem. I mangeland har nosokomiale infeksjoner med multiresistente enterokokker ført til økt sykkelighet og dødelighet.

Slikebakteriestammer er ofte resistente mot ampicillin, aminoglykosider og glykopeptider. Spredning av slike bakterier harvært satt i sammenheng med antibiotikabruk i landbruket, høyt forbruk av antibiotika i humanmedisin og sviktendesykehushygiene. Vi presenterer her seks tilfeller av infeksjon og tre tilfeller av smittebærerskap medvankomycinresistente enterokokker som er påvist ved norske sykehus. Miljøundersøkelser ved sykehusene viser at slikestammer ikke er vanlig forekommende blant norske pasienter. Det er nødvendig med god sykehushygiene og en fornuftigantibiotikapolitikk for å opprettholde denne gunstige situasjonen.

Publisert: 30. oktober 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 28. mars 2026.