
Ecstasy - kult dop med senfølger?

ARTIKKEL

LIBERG J-P

HOVDA KE

NORDBY G

JACOBSEN D

Sammendrag

MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er et amfetaminderivat som første gang ble syntetisert i begynnelsen av dette århundret. Fra opprinnelig å være et appetittthemmende middel er det blitt benyttet som et hjelpemiddel i psykoterapien og nå i bestemte ungdomsmiljøer som et rusmiddel. MDMA blir oftest assosiert med ecstasy, selv om ecstasy som regel også inneholder andre amfetaminderivater. Ecstasybrukerne opplever eufori, økt energinivå og en bedret kommunikasjon, men ecstasy kan også gi utilsiktede virkninger som psykose, angst og depresjoner. Somatiske komplikasjoner ved ecstasybruk er hypertermi, kramper, rabdomyolyse, akutt nyresvikt og leverskader. Kunnskapen om langtids effekter og eventuelle skadevirkninger av stoffet er fortsatt mangelfull, selv om visse mønstre er i ferd med å avtegnes.

Publisert: 20. november 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 6. februar 2026.