
Choledochuscyster hos voksne

ARTIKKEL

TRONDSEN E

BUANES T

Sammendrag

Med utgangspunkt i en kasuistikk omtales choledochuscyster hos voksne. Tilstanden er sjelden og oversees ofte. Etiologien er ukjent. Symptomer er intermitterende smerter eller ubehag og episoder med icterus, kolangitt og pankreatitt. Forhøyede leverenzymverdier og gallesteinssykdom er vanlig. Det er økt risiko for maligne svulster i cysten og nærliggende organer. Ultralydundersøkelse, computertomografi, endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi, perkutan kolangiografi og magnetisk resonanstomografi (MR) med MR-kolangiopankreatikografi benyttes for fremstilling. Ekstrahepatiske cyster skal eksideres radikalt med Roux-Y hepatikojejunostomi eller andre rekonstruksjoner som underletter postoperativ diagnostikk og terapi. Cyster i relasjon til papilla Vateri behandles med endoskopisk finkterotomi. Moderne behandlingsprinsipper gir gode langtidsresultater.

Publisert: 10. mai 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2025. Lastet ned fra tidsskriftet.no 20. desember 2025.