
Tensjonsfri vaginaltape - ny operasjonsmetode for stressinkontinens hos kvinner

ARTIKKEL

SCHIØTZ HA

Sammendrag

En forenklet operasjonsmetode for stressinkontinens hos kvinner er nylig utviklet i Sverige. Den oppfyller kriteriene for et minimalt invasivt inngrep og operasjonen gjøres vanligvis i lokalanestesi. Metoden går ut på å plassere et bånd av prolene som en slynge under urethra uten tensjon. Vår erfaring med de første 42 pasientene presenteres.

Alle de 42 kvinner som ble operert i 1996 og 1997, gjennomgikk subjektiv og objektiv evaluering i 1998. Preoperativt hadde alle stressinkontinens av betydelig grad. Oppfølgingstiden er 6-27 måneder, i gjennomsnitt 16 måneder.

Inngrepet ble godt tolerert. Alle unntatt fire av pasientene ble utskrevet innen 24 timer. Av komplikasjoner var dette blæreperforasjoner som tilhelt spontant, ett tilfelle av hudinfeksjon, og i ett tilfelle måtte vaginalsårretrevideres pga. manglende tilheling. Det var ingen dype infeksjoner eller avstøtingsreaksjoner, og ingen fikk kurgeinkontinens. Subjektivt ble 85,4% av pasientene kurert og 9,8% ble nesten bra og brukte ikke lenger beskyttelse. Objektivt vurdert ble 80,5% kurert og 12,2% > 90% bedret.

Vår erfaring så langt er meget positiv. Inngrepet tolereres godt, har få komplikasjoner og selv om det ikke er gjortsammenliknende studier, synes resultatene å være på høyde med tradisjonelle metoder.

Publisert: 20. juni 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2025. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. desember 2025.