
Nevrosyfilis - fortsatt aktuell differensialdiagnose

ARTIKKEL

HEM E

SMALL T

OPJORDSMOEN S

MYRVANG B

Sammendrag

Syfilis, i alle stadier, er nærmest utryddet i vårt land. Samtidig øker forekomsten av sykdommen sterkt i vårenærområder som Russland og Baltikum. Dette krever skjerpet oppmerksomhet.

Vi rapporterer tre tilfeller fra akuttpsykiatrisk avdeling diagnostisert som nevrosyfilis i perioden 1994-97. For to av pasientene gikk det henholdsvis sju og 15 måneder før diagnosen ble stilt. Diagnosen er vanskelig av flere grunner. Sykdommen er sjelden, og mange leger har ikke selv sett pasienter med denne tilstanden. En rekke pasienter er behandlet med antibiotika for andre lidelser, noe som kan tåkelegge det kliniske bildet. Symptomene er mangeartede, og nevrosyfilis forsvarer fremdeles betegnelsen "den store imitator". Det foreligger muligens atypiske former som har lite til felles med de klassiske sykdomsbildene tabes dorsalis og paralysis generalis. Anamnesen er ofte til liten hjelp på grunn av fortrenghing, fortielse, forglemmelse eller hukommelsessvekkelse forårsaket av sykdommen selv. Dentradisjonelle syfilisscreening er ikke aktuell, men vi anbefaler økt årvåkenhet overfor diagnosen og lav terskel for årekvirere serologiske undersøkelser.

Publisert: 30. juni 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 27. mars 2026.