
Perkutan galleblæredrenasje ved akutt kolecystitt

ARTIKKEL

BAKKE K

NAVJORD D

NILSEN BH

Sammendrag

Perkutan kolecystektomi har i løpet av de siste 10-15 år erstattet kirurgisk behandling ved akutt kolecystitt hos pasienter under intensivbehandling og hos kirurgiske høyrisikopasienter. Vi ønsket å evaluere drenasjene utført ved Lillehammer fylkessykehus. Artikkelen omtaler 32 drenasjer utført i løpet av de siste tre år. Tekniske problemer og komplikasjoner under og etter prosedyren ble registrert. I et materiale med forholdsvis få prosedyrer per radiolog, var alle primært vellykkede. Ingen alvorlige, prosedyrerelaterte komplikasjoner oppstod. Drendisløkasjon forekom i fem av 32 tilfeller, noe som ikke er høyere enn hva andre har rapportert. Vi konkluderer med at hos denne høyrisikogruppen er perkutan kolecystostomi ved akutt kolecystitt en sikker prosedyre ved vårt sykehus.

Publisert: 20. september 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 25. mars 2026.