
Sentralstimulerende legemidler og misbrukspotensial ved hyperkinetisk forstyrrelse

ARTIKKEL

AANONSEN NO

Sammendrag

Medisinsk bruk av metylfenidat både til barn og voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/AD/HD synes i praksis ikke å medføre risiko for stoffmisbruk, alvorlige komplikasjoner eller medikamentavhengighet. Nyere farmakokinetiske PET-studier synes å støtte at misbrukspotensialet er beskjedent. Pågående misbruksproblematikk er en absoluttkontraindikasjon, tidligere stoffmisbruk og kriminalitet er relative kontraindikasjoner. Metylfenidat er førstevalgspreparat ved hyperkinetisk forstyrrelse/AD/HD hos voksne.

Effekten av dektroamfetamin hos voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/AD/HD er sparsomt dokumentert, og behandlingen krever kontrolltiltak pga. misbrukspotensial. Ved tidligere misbruksproblematikk er dektroamfetamin ettervårt syn kontraindisert.

Publisert: 10. november 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 21. mars 2026.