

Appendiks til Oddvar Solli, Minda Halkinrud. Helsedata – en enkel metode for utvidet innsikt. Tidsskr Nor
Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0633.

Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet redaksjonelt.

Figur 1 Aggregert oversikt over refusjonskoder for hjerte/kar sykdom, diabetes og psykiske lidelser blant pasienter med brystkreft

Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet 15.10.2020 Datamaterialet er basert på utleveringer registrert i Reseptregisteret til pasientene mottatt fra Kreftregisteret, inntil to år før og to år etter kvinnens diagnosedato for brystkreft (ICD-10 kode C50) i Kreftregisteret i 2017 Det var totalt 3565 unike individer i pasientene mottatt fra Kreftregisteret Datamaterialet er basert på resepter til individer som er registrert i apoteket med gyldig fødselsnummer				
Refusjonskoder	Periode			
	365-730 dager før diagnosedato	1-364 dager før diagnosedato	1-364 dager etter diagnosedato	365-730 dager etter diagnosedato
Antall med komorbiditet hjerte og karsykdom (KHK) - definert som minst én registrering med minst én av refusjonskodene i løpet av perioden: ICD-10: -27, -26, -22, I10, I11, I12, I13, I15, I20, I20.0, I21, I22, I25, I25.1, I25.2, I26, I27, I27.0, I27.9, I28, I30, I33, I34, I35, I36, I37, I38, I40, I42, I45, I47, I48, I49, I50, I50.1, I61, I62, I65, I66, I67, I67.2, I70, I70.2, I73.0, I73.9. ICD-10: -27, -26, -22, I74, K70, K71, K74, K75, K76, K77, K78, K79, K80, K82, K83, K84, K86, K87, K89, K90, K91, K92, K99	1396	1462	1522	1458
Antall med komorbiditet diabetes (DB) - definert som minst én registrering med minst én av refusjonskodene i løpet av perioden: ICD-10: E10, E10.2, E11, E11.2, E13, E14. ICD-10: T89, T90	204	208	220	227
Antall med komorbiditet psykiske lidelser (PL) - definert som minst én registrering med minst én av refusjonskodene i løpet av perioden: ICD-10: -74, -73, -72, -F2, -F3, -F4, F06, F10.5, F11.5, F12.5, F13.5, F14.5, F15.5, F16.5, F18.5, F19.5, F20, F21, F22, F23, F23.1, F23.2, F24, F25, F28, F30, F30.2, F31, F32, F32.3, F33, F33.3. ICD-10: -74, -73, -72, P71, P72, P73, P74, P76, P98, P99	407	447	474	460

Figur 2 Frekvens av de enkelte refusjonskodene for hjerte/kar sykdom, diabetes og psykiske lidelser blant pasienter med brystkreft

Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet 15.10.2020

Datamaterialet er basert på utleveringer registrert i Reseptregisteret til pasientene mottatt fra Kreftregisteret, inntil to år før og to år etter kvinnens diagnosedato for brystkreft (ICD-10 kode C50) i Kreftregisteret i 2017

I tabellene inngår antall individer som har fått utlevert minst én resept registrert med hver av refusjonskodene som var forhåndsdefinert av Pfizer innen komorbiditet hjerte og karsykdom, diabetes og psykiske lidelser.

Tabell 1A gir en oversikt over refusjonskoder basert på ICD-10 og tabell 1B gir en oversikt over refusjonskoder basert på ICD-10

I tillegg hvor datamaterialet er basert på færre enn 10 individer er dette angitt som "<10"

Datamaterialet er basert på resepter til individer som er registrert i apoteket med gyldig fødselsnummer

Refusjonskode ICD-10	Antall individ	Indikasjon
I10	196	Essensiell (primær) hypertensjon
-26	156	Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)
-27	142	Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)
I48	110	Atrieflimmer og atrieflutter
"-F3"	106	Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse
I60	81	Hjertesvikt
E11	56	Diabetes mellitus type 2
I11	52	Hypertensiv hjertesykdom
I26	52	Lungeemboli
I20	38	Angina pectoris
"-F4"	30	Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse
E10	25	Diabetes mellitus type 1
I21	25	Akutt hjerteinfarkt
-22	23	Sekundærproglakse etter hjerteinfarkt
I47	20	Paroksysmal takykardi
I63	20	Hjerteinfarkt
"-F2"	15	Behandlingskrevende psykiske eller psykosenære symptomer ved
I49	15	Angina pectoris
I15	13	Sekundær hypertensjon
I11.0	12	Hypertensiv hjertesykdom med
E11.2	<10	Diabetes mellitus type 2 med
E13	<10	Andre spesialiserte typer diabetes
E14	<10	Uspesifisert diabetes mellitus
F25	<10	Schizofreniske lidelser
F28	<10	Andre ikke-organiske psykoser
F31	<10	Bipolar affektiv lidelse
I12	<10	Hypertensiv nyrer sykdom
I13	<10	Hypertensiv hjerte- og nyrer sykdom
I20.0	<10	Ustabil angina
I22	<10	Forbigående hjerteinfarkt
I25	<10	Kronisk iskemisk hjertesykdom
I25.1	<10	Aterosklerotisk hjertesykdom
I25.2	<10	Gammelt hjerteinfarkt
I27	<10	Andre pulmonale hjertesykdommer
I30	<10	Akutt perikarditt
I34	<10	Ikke-reumatiske mitralklaffefeil
I38	<10	Endokarditt, uspesifisert klaff
I70.2	<10	Aterosklerose arterie eksstremitet
I74	<10	Emboli og trombose i arterier

Refusjonskode ICD-10	Antall individ	Indikasjon
K86	1131	Hypertensjon ukomplicert
-73	520	Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse
-27	513	Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)
-26	322	Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)
K87	275	Hypertensjon med komplikasjoner
T90	229	Diabetes type 2
K78	212	Atrieflimmer/flutter
K77	180	Hjertesvikt
-74	174	Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse
K74	170	Iskemisk hjertesykdom med angina
K79	53	Paroksysmal takykardi
K80	53	Hjerteangst IKA
T89	53	Diabetes type 1
-72	46	Behandlingskrevende psykiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse
K75	41	Akutt hjerteinfarkt
K90	40	Hjerneslag
-22	34	Sekundærproglakse etter hjerteinfarkt
K89	20	Forbigående cerebralt iskemi
K76	11	Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA
K71	<10	Reumatisk feber/hjertesykdom
K82	<10	Pulmonal hjertesykdom
K83	<10	Hjerteinfarkt IKA
K84	<10	Hjertesykdom IKA
K91	<10	Cerebrovaskulær sykdom
K92	<10	Aterosklerose
P73	<10	Afektiv lidelse
P74	<10	Angstlidelse
P76	<10	Depressiv lidelse