

Norske læger har en forholdsvis kort levetid

I Tidsskriftet i 1915 presenterte Isak Kobro (1867–1953) statistikk over alder og dødsårsak for ca. 1 000 leger som var døde i årene 1800–1908 (s. 873–80). Tallene var basert på opplysninger fra verket *Norges læger*.

Dødsfald blant norske læger

Gjennomsnittsalderen for 1012 norske læger var 55,805 aar (..). Altsaa skulde den gjennomsnittlige tilbakestaaende levetid for en netop uteksaminert læge (27 aar gl.) være: 28,805. Til sammenligning kan anføres fra «Norges offic. statistikk, livs- og dødstabeller for det norske folk (1891–1901)», at den gjennomsnittlig tilbakestaaende levetid for en 30 aar gammel mand var 37,68.

(...)

Det er selvfølgelig ikke riktig at trække absolut sikre slutninger av denne statistikk, – dertil er det foreliggende materiale ikke helt skikket. Gjennem et saa langt tidsrum (1800–1908) har jo sygdomsopfatningerne variert betydelig, og kilderne har ikke altid været saa paalidelige som ønskelig kunde være. Men det samlede antal dødsfald er dog saapas stort, at man i disse tabeller faar nogenlunde sikkert bekræftet følgende:

- 1) norske læger har en forholdsvis kort levetid;
- 2) paa grund av sin gjerning er de særlig utsat for infektionssygdomme og ulykker;
- 3) kræftsygdomme og apopleksi medfører forholdsvis mange dødsfald blandt dem.