

«Fri meningsutveksling om medisin og helse er viktig for leger, helsebyråkrater, politikere og pasienter. I Tidsskriftet har vi nå lagt om spaltene slik at debattstoffet kommer først. Ta det som en invitasjon!»

Se leder side 471

Hivsmitte fra mor til barn kan forebygges

Ett av tre barn født av hivinfisert mor vil bli smittet uten forebyggende tiltak. Smitte kan forebygges med systematisk hivtesting av gravide, antiretroviral behandling av mor og barn og forløsning med keisersnitt. Slike forebyggende tiltak er ofte ikke tilgjengelig i Afrika sør for Sahara, der mesteparten av hivsmitte fra mor til barn skjer. Skal amming frarådes eller oppmuntres? Verdens helseorganisasjon anbefaler nå amming for hivinfiserte mødre i fattige land når anti-retrovirale midler gis samtidig.

Side 468, 475, 480, 520

Usikre dødsattester

Registrert dødsårsak kan være feil ved om lag en femdel av dødsattestene etter 496 dødsfall ved Akerhus universitetssykehus i 2008. Dødsattester og sykehistorie ved død bør gås gjennom rutinemessig for å sikre gode tilbakemeldinger til klinikerne, særlig nå som antall obduksjoner har gått kraftig ned, ifølge forfatterne av studien.

Side 476

Urindyppekultur

Bakteriekonsentrasjonen i urin kan bestemmes ved hjelp av dyppekultur, som også kan benyttes som transportmedium til laboratorium for sikker identifikasjon av bakterie og resistensmønster. Urindyppekultur kan anvendes ved kompliserte urinveisinfeksjoner og ved asymptomatisk bakteriuri hos gravide, men skal ikke brukes ved ukomplisert cystitt. Korrekt prøvetaking og håndtering av urinprøver er viktig.

Side 483

Legemidler mot multippel sklerose

Multippel sklerose debuterer oftest med gjentatte subakutte angrep med utfall fra sentralnervesystemet. Over tid vil stadig flere utvikle sekundær progredierende sykdom. Moderate til alvorlige angrep skal behandles med metylprednisolon. Ved gjentatte angrep er det aktuelt med forebyggende behandling med ulike immunmodulerende legemidler, hvorav noen kan administreres av pasienten selv – med tett oppfølging av spesialopplært sykepleier og nevrolog.

Side 490

Risiko ved anestesi

Alvorlige komplikasjoner ved anestesi er sjeldent, og risikoen er avhengig av pasientens helsetilstand forut for operasjonen. Barn under ett år har høyere forekomst av alvorlige komplikasjoner enn større barn og voksne. Komplikasjoner er særlig knyttet til luftveier og sirkulasjon.

Anafylaksi under anestesi skyldes hyppigst muskelrelakserende medikamenter. Tidlig behandling med adrenalin, væske og ekstra oksygen kan være avgjørende for overlevelse uten men. Pasienter med alvorlige anafylaksireaksjoner bør utredes.

Side 498, 503, 507



Nye muligheter i Min side

Ønsker du å bli varslet på e-post når det publiseres nye diskusjonsforuminnlegg i Min side? Bare logg deg inn og velg hvilke fora du ønsker å følge.

Det har i en periode vært umulig å se og endre egne profilopplysninger på Min side. Denne funksjonen er nå på plass igjen.

Charlotte Haug

Charlotte Haug
redaktør



Forsiden

Illustrasjonsfoto © Hannelie Coetzee/Masterfile/SCANPIX

Kjærlighet og næring⁴⁶¹

Denne kvinnen har ikke hiv og har ikke måtte forholde seg til det vanskelige spørsmålet mange mødre, spesielt i Afrika, har stått overfor – er det trygt å amme når man er hivpositiv?

Nå er det kommet nye anbefalinger om hiv og amming fra Verdens helseorganisasjon. Se side 468, 475, 480, 520